

保護者の皆様へ

園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐために医師により下記の疾患と診断された場合は、主治医の指示による登園届を園へ提出してください。

<u>病名</u>	<u>感染しやすい期間</u>	<u>登園の目安</u>
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1~2 日間	抗菌薬内服後 24 時間経過している事
マイコプラズマ肺炎	抗菌薬治療の開始前と開始後数日	発熱、激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水泡、潰瘍が発症した数日間	発熱、潰瘍の影響がなく普段の食事がとれる
伝染性紅斑（りんご病）	発疹出現前の 1 週間	全身状態が良いこと
感染性胃腸炎 (ノロウイルス・ロタウイルスなど)	症状のある間(便の中に数週間ウィルスを排泄しているので要注意)	嘔吐下痢などの症状が治まり、食事がとれる
ヘルパンギーナ	急性期の期間(便の中に 1 ヶ月 ウィルスを排泄しているので要注意)	呼吸状態が消失し全身状態が良いこと
RS ウィルス	呼吸症状のある間	呼吸症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹(ヘルペス)	水泡を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
麻疹(はしか)	発症 1 日前から発疹出現の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過してから
インフルエンザ	発症 2~4 時間前から後 3 日間が最も多く通常 7 日以内に減る	発症した後 5 日を経過し、解熱した後 3 日後
風疹	発疹出現の数日前から後の 5 日間ぐらいの	発疹が消失してから
水痘(水疱瘡)	発疹の出現 2 日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発疹 2 日前から耳下腺腫脹後 5 日	耳下腺の腫脹が消失してから
咽頭結膜炎(プール熱)	発熱、充血など症状が出現した数日間	主な症状が消えて 2 日経過してから
流行性結膜炎 (はやり目)	充血、眼脂など症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること
腸管出血性大腸菌感染症 (O157 など)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し 48 時間あけて連続 2 回の検便により陰性の場合

社会福祉法人 おおぞら
つばさ保育園 長崎市宿町 150-1 Tel 095-839-0283

登 園 届

つばさ保育園園長 宛

園児氏名

病名 「

」

平成 年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園許可と認めます。

平成 年 月 日

医療機関

医師名